2015-0168
2015-01-22

Marrone Bio Innovations

Regalia® Maxx
Biofongicide en concentré liquide

COMMERCIAL

Un extrait de plante qui permet de déclencher les mécanismes de défense naturels des plantes contre certaines maladies fongiques et bactériennes.

GARANTIE : Extrait de *Reynoutria sachalinensis*..... 20 %

AVERTISSEMENT : IRRITANT POUR LES YEUX
ATTENTION : IRRITANT POUR LA PEAU

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

N° D'HOMOLOGATION 30199 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

CONTENU NET : 1 L to 50 L

Marrone Bio Innovations, Inc.
1540 Drew Ave.
Davis (Californie) ÉTATS-UNIS 95618
info@marronebio.com
1-877-664-4476

Date de fabrication :

Fabriqué aux États-Unis

AVIS À L'UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

MISES EN GARDE

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Cause une irritation modérée des yeux. Éviter TOUT contact avec les yeux. Peut irriter la peau. Éviter tout contact avec la peau et les vêtements. Peut irriter les voies respiratoires. Éviter d'inhaler ou de respirer le brouillard de pulvérisation. Porter une chemise à manches longues, un pantalon long, des gants imperméables, des chaussettes et des chaussures, et des lunettes à coques ou un écran facial lors de la manipulation, du mélange/chargement ou de l'application du produit, et durant toutes les activités de nettoyage et de réparation. NE PAS retourner sur les lieux traités ni permettre d'y retourner tant que le produit n'est pas sec. Il faut procéder à la manipulation et au chargement de Regalia® Maxx Biofongicide en concentré liquide, de même qu'au nettoyage et à l'entretien, dans un endroit bien aéré. Ne traiter que lorsque toute possibilité de dérive vers les endroits occupés ou utilisés par des humains tels que les maisons, chalets, écoles et espaces récréatifs est minime. Tenir compte de la vitesse et de la direction du vent, des inversions de la température, de l'équipement d'épandage et des réglages du pulvérisateur. Se laver à fond avec de l'eau et du savon après avoir manipulé le produit. Enlever et laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

Lorsqu'on utilise un pulvérisateur à haute pression ou que l'on pénètre dans une zone de traitement de la serre avant de l'avoir entièrement aérée et que le brouillard de pulvérisation ne se soit dissipé, les opérateurs antiparasitaires/travailleurs doivent porter un respirateur approuvé par le NIOSH, des vêtements de protection, des chaussettes et des chaussures, des gants imperméables et des lunettes à coques.

Garder les personnes non protégées hors des zones traitées de la serre durant toute la période de traitement.

Il est permis de pénétrer dans la serre uniquement après l'avoir entièrement aérée, que le brouillard de pulvérisation se soit dissipé et que la surface traitée soit sèche.

PREMIERS SOINS

EN CAS D'INGESTION : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU ET LES VÊTEMENTS : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
EN CAS D'INHALATION : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
Apporter l'étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsque vous consultez un médecin.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter selon les symptômes.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION
Pour empêcher toute contamination, entreposer ce produit loin de la nourriture humaine ou animale.

ENTREPOSAGE : Entreposer dans un lieu sec auquel les enfants n'ont pas accès. Entreposer le produit dans le contenant d'origine seulement. Garder le contenant fermé entre chaque utilisation.

ÉLIMINATION
1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir.
2. Vérifier si un nettoyage supplémentaire du contenant avant son élimination est exigé en vertu de la réglementation provinciale.
3. Rendre le contenant inutilisable.
4. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.
5. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

DANGERS ENVIRONNEMENTAUX
NE PAS contaminer l'approvisionnement en eau potable, les sources d'eau d'irrigation ni les habitats aquatiques lors du nettoyage de l'équipement ou de l'élimination des eaux de nettoyage. EMPÊCHER les effluents et le ruissellement contenant ce produit et provenant des serres de ne s'infiltrer dans les lacs, les cours d'eau, les étangs et autres étendues d'eau.

RECOMMANDATION GÉNÉRALE SUR L'UTILISATION
Regalia® Maxx Biofongicide en concentré liquide contient un extrait de la plante *Reynoutria sachalinensis* pour usage sur les plantes ornementales et les cultures comestibles. Regalia® Maxx Biofongicide en concentré liquide appliqué sur les tissus végétaux en pleine croissance déclenchera des réactions de tolérance à certaines maladies dans la zone traitée des feuilles et des bourgeons. Regalia® Maxx Biofongicide en concentré liquide peut s'appliquer en pulvérisation foliaire seul ou dans le cadre d'un programme de pulvérisation, en alternance avec d'autres produits homologués pour la protection des cultures. Lorsque les conditions sont favorables à une pression importante par des ravageurs, utiliser Regalia® Maxx Biofongicide en concentré liquide dans le cadre d'un programme de rotation avec d'autres fongicides homologués. Regalia® Maxx Biofongicide en concentré liquide peut s'appliquer au moyen d'un équipement d'épandage au sol.

LUTTE ANTIPARASITAIRE INTÉGRÉE (LAI)
Intégrer Regalia® Maxx Biofongicide en concentré liquide à une stratégie générale de lutte antiparasitaire contre la maladie lorsqu'il faut utiliser un fongicide. Suivre les pratiques qui permettent de réduire le développement de la maladie. Consulter les autorités locales pour connaître les stratégies particulières de LAI développées pour vos cultures et votre région.

DÉTERMINATION DE LA DOSE D'UTILISATION
Lire attentivement et suivre le mode d'emploi, les doses d'utilisation et les restrictions indiqués sur l'étiquette. Regalia® Maxx Biofongicide en concentré liquide doit être appliqué avant ou au tout début du développement de la maladie. Utiliser les doses maximales et des intervalles de pulvérisation plus courts lorsque les conditions favorisent un développement rapide de la maladie. Pour une application précise, établir le nombre d'hectares à traiter et la dose d'utilisation indiquée sur l'étiquette, et choisir les volumes d'eau appropriés qui donnent une bonne pénétration du couvert et des parties végétales à protéger. Ne

préparer que la quantité de bouillie requise pour traiter la superficie mesurée. Il est essentiel de bien régler l'équipement de pulvérisation avant l'utilisation.

DÉLAI D'ATTENTE AVANT RÉCOLTE
Regalia® Maxx Biofongicide en concentré liquide peut s'appliquer jusqu'à la récolte et y compris celle-ci.

DIRECTIVES D'APPLICATION – Usage agricole
EN GÉNÉRAL : L'opérateur antiparasitaire est tenu d'éviter la dérive de pulvérisation au lieu d'application. L'interaction de plusieurs facteurs liés à l'équipement et à la température détermine le potentiel de dérive de pulvérisation. C'est à l'opérateur antiparasitaire et au cultivateur/coordonnateur de traitement de tenir compte de tous ces facteurs au moment de prendre une décision. Lorsque les provinces/territoires ont des règlements plus sévères, il faut les respecter.

Ce produit n'est pas homologué pour la suppression des ravageurs dans des systèmes aquatiques. NE PAS utiliser ce produit pour supprimer les ravageurs aquatiques.

AU SOL : Une couverture complète est essentielle pour une lutte optimale contre la maladie. Pour obtenir une bonne couverture, utiliser la pression de pulvérisation, le nombre de litres par hectare, de buses, l'espace entre les buses et la vitesse au sol appropriés. Consulter les catalogues de buses et d'accessoires de pulvérisation pour obtenir des renseignements particuliers sur le réglage exact de l'équipement.

INSTRUCTIONS POUR LE MÉLANGE
MÉLANGE : Regalia® Maxx Biofongicide en concentré liquide doit être dilué dans l'eau pour les traitements en pulvérisation et peut s'utiliser dans un équipement de pulvérisation servant couramment aux traitements terrestres. Remplir le réservoir de pulvérisation partiellement avec de l'eau propre et commencer l'agitation. Ajouter au réservoir la quantité indiquée de Regalia® Maxx Biofongicide en concentré liquide. Terminer de remplir le réservoir jusqu'au volume requis afin d'obtenir la concentration de pulvérisation voulue. Maintenir l'agitation continuellement pendant le traitement. Ne pas laisser la bouillie de pulvérisation reposer pendant la nuit ou des périodes prolongées.

Doses d'emploi pour Regalia® Maxx Biofongicide en concentré liquide

MODE D'EMPLOI : Lorsqu'il est appliqué selon le mode d'emploi (voir ci-dessous), Regalia® Maxx Biofongicide en concentré liquide réprime les maladies indiquées. Dans des conditions où la pression exercée par la maladie est modérée ou élevée, adopter la dose supérieure et l'intervalle plus court indiqué. Appliquer dans un volume d'eau qui suffit à assurer une bonne couverture. Pour la plupart des applications, Regalia® Maxx Biofongicide en concentré liquide doit être appliqué à raison de 400 à 1 000 L/ha. Pour les utilisations en serre, mélanger Regalia® Maxx Biofongicide en concentré liquide dans l'eau à la dose indiquée dans le mode d'emploi pour les cultures particulières, et l'appliquer comme pulvérisation en pleine surface sur les feuilles pour obtenir une couverture maximale. Pour obtenir d'autres instructions, voir le mode d'emploi pour les cultures particulières.

Application terrestre seulement. Bien agiter avant l'emploi. Utiliser des tamis de buse de 50-mailles ou plus. Les réactions de tolérance ne sont déclenchées que dans les tissus verts et les bourgeons traités de la plante; bien qu'il y ait un certain mouvement systémique, il importe de couvrir complètement les feuilles.

DOSES ET MODE D'EMPLOI POUR DES CULTURES PARTICULIÈRES

Plantes ornementales
Plantes à fleurs annuelles et vivaces
Culture à l'extérieur et culture en serre

Regalia® Maxx Biofongicide en concentré liquide peut s'utiliser pour la répression du blanc de plantes ornementales cultivées dans des contenants, banquettes, plateaux, mottes, planches ou au champ, dans des serres, serres froides, pépinières à l'extérieur, pépinières au détail et autres zones d'aménagement paysager.

Les espèces ornementales n'ont pas toutes été testées pour la résistance à Regalia® Maxx Biofongicide en concentré liquide. Il faut tester un petit nombre de plantes avant de procéder à l'utilisation dans une production commerciale.

Répression du blanc, *Oidium* spp.
Dose : 0,125 à 0,25 % vol/vol (1,25 à 2,50 mL/L ou 500 à 1 000 mL par 400 L d'eau)

Répression du mildiou, *Plasmopora viburni* et *Peronospora* spp.
Répression partielle des maladies bactériennes foliaires, *Xanthomonas campestris* et *Pseudomonas chickorii*
Dose : 0,25 % vol/vol (2,50 mL/L ou 1 000 mL par 400 L d'eau)

Culture à l'extérieur et culture en serre – Commencer l'application dès l'apparition de la maladie, ou lorsque les conditions en favorisent le développement. Répéter au besoin à un intervalle de 7 à 10 jours. Attendre deux semaines suivant le repiquage avant de faire la première application. Pulvériser le produit jusqu'avant le ruissellement. Le volume de pulvérisation réel variera selon la taille des plantes à traiter. Ne pas appliquer dans un volume de pulvérisation dépassant 1 500 L/ha.

Blé

Répression partielle de la tache septorienne (*Septoria tritici*).

Appliquer Regalia® Maxx Biofongicide en concentré liquide à titre préventif ou dès l'apparition de la maladie après la montaison, à raison de 0,25 % vol/vol dans 400 à 600 litres d'eau par hectare. Répéter les applications à des intervalles de 7 à 14 jours selon le stade de croissance des cultures et la pression exercée par la maladie. Lorsque les conditions environnementales et le stade de croissance des plantes favorisent le développement rapide de la maladie, utiliser Regalia® Maxx Biofongicide en concentré liquide dans le cadre d'un programme de rotation avec d'autres fongicides homologués.

Groupe de culture 9 : Cucurbitacées : Cantaloup, concombre, citrouille, courgette, melon d'eau, melon, melon brodé et courge
Culture à l'extérieur et culture en serre

Répression du blanc (*Sphaerotheca fuliginea* et *Erysiphe cichoracearum*)

Culture à l'extérieur – Appliquer Regalia® Maxx Biofongicide en concentré liquide à titre préventif ou dès l'apparition de la maladie à raison de 0,125 à 0,25 % vol/vol dans 500 à 1 000 litres d'eau par hectare. Répéter les applications à des intervalles de 7 à 10 jours selon le stade de croissance des cultures et la pression exercée par la maladie. Lorsque les conditions environnementales et le stade de croissance des plantes favorisent le développement rapide de la maladie, utiliser Regalia® Maxx Biofongicide en concentré liquide dans le cadre d'un programme de rotation avec d'autres fongicides homologués.

Culture en serre – **Dose:0,125 à 0,25 % vol/vol (1,25 à 2,50 mL/L ou 500 à 1 000 mL par 400 L d'eau)**

Commencer à traiter dès l'apparition de la maladie, ou lorsque les conditions commencent à favoriser le développement de la maladie. Répéter au besoin à un intervalle de 7 à 10 jours. Pulvériser le produit jusqu'à tout juste avant le ruissellement. Le volume de pulvérisation réel variera selon la taille des plantes à traiter. Ne pas appliquer dans un volume de pulvérisation dépassant 1 500 L/ha.

Lorsque les conditions environnementales et le stade de la plante favorisent le développement rapide de la maladie, utiliser Regalia® Maxx Biofongicide en concentré liquide dans un programme de rotation avec d'autres fongicides homologués. Lorsque l'incidence de la maladie est élevée chez les cucurbitacées de serre, adopter l'intervalle de traitement plus court.

Répression du mildiou (*Pseudoperonospora cubensis*)

Culture en serre – **Dose : 0,25 % vol/vol (2,50 mL/L ou 1 000 mL par 400 L d'eau)**

Commencer à traiter dès l'apparition de la maladie, ou lorsque les conditions commencent à favoriser le développement de la maladie. Répéter au besoin à un intervalle de 7 à 10 jours. Pulvériser le produit jusqu'à tout juste avant le ruissellement. Le volume de pulvérisation réel variera selon la taille des plantes à traiter. Ne pas appliquer dans un volume de pulvérisation dépassant 1 500 L/ha.

Lorsque les conditions environnementales et le stade de la plante favorisent le développement rapide de la maladie, utiliser Regalia® Maxx Biofongicide en concentré liquide dans un programme de rotation avec d'autres fongicides homologués. Lorsque l'incidence de la maladie est élevée chez les cucurbitacées de serre, adopter l'intervalle de traitement plus court.

Tomate
Culture à l'extérieur et culture en serre

Répression de la brûlure bactérienne (*Xanthomonas campestris*)

Culture à l'extérieur – Appliquer Regalia® Maxx Biofongicide en concentré liquide à titre préventif peu après le repiquage à raison de 0,125 à 0,25 % vol/vol dans 400 à 1 000 litres d'eau par hectare. Répéter les applications à des intervalles de 7 à 10 jours selon le stade de croissance des cultures et la pression exercée par la maladie. Lorsque les conditions environnementales et le stade de croissance des plantes favorisent le développement rapide de la maladie, utiliser Regalia® Maxx Biofongicide en concentré liquide dans le cadre d'un programme de rotation avec d'autres bactéricides homologués.

Culture en serre – **Dose:0,125 à 0,25 % vol/vol (1,25 à 2,50 mL/L ou 500 à 1 000 mL par 400 L d'eau)**

Commencer à traiter dès l'apparition de la maladie, ou lorsque les conditions commencent à favoriser le développement de la maladie. Répéter au besoin à un intervalle de 7 à 10 jours. Pulvériser le produit jusqu'à tout juste avant le ruissellement. Le volume de pulvérisation réel variera selon la taille des plantes à traiter. Ne pas appliquer dans un volume de pulvérisation dépassant 1 500 L/ha.

Répression du blanc (*Oidium neolycopersici* et *Leveillula taurica*)

Culture en serre – **Dose:0,125 à 0,25 % vol/vol (1,25 à 2,50 mL/L ou 500 à 1 000 mL par 400 L d'eau)**

Commencer à traiter dès l'apparition de la maladie, ou lorsque les conditions commencent à favoriser le développement de la maladie. Répéter au besoin à un intervalle de 7 à 10 jours. Pulvériser le produit jusqu'à tout juste avant le ruissellement. Le volume de pulvérisation réel variera selon la taille des plantes à traiter. Ne pas appliquer dans un volume de pulvérisation dépassant 1 500 L/ha.

Lorsque les conditions environnementales et le stade de la plante favorisent le développement rapide de la maladie, utiliser Regalia® Maxx Biofongicide en concentré liquide dans un programme de rotation avec d'autres fongicides homologués.

Répression de la pourriture grise (*Botrytis cinerea*)

Culture à l'extérieur – Appliquer Regalia® Maxx Biofongicide en concentré liquide à titre préventif ou dès l'apparition de la maladie à raison de 0,25 % vol/vol dans un volume d'eau suffisant à assurer une couverture complète. Répéter les applications à des intervalles de 7 à 10 jours selon le stade de croissance des cultures et la pression exercée par la maladie. Lorsque les conditions environnementales et le stade de croissance de la plante favorisent le développement rapide de la maladie, utiliser Regalia® Maxx Biofongicide en concentré liquide dans le cadre d'un programme de rotation avec d'autres fongicides homologués.

Culture en serre – **Dose : 0,25 % vol/vol (2,50 mL/L ou 1 000 mL par 400 L d'eau)**

Commencer à traiter dès l'apparition de la maladie, ou lorsque les conditions commencent à favoriser le développement de la maladie. Répéter au besoin à un intervalle de 7 à 10 jours. Pulvériser le produit jusqu'à tout juste avant le ruissellement. Le volume de pulvérisation réel variera selon la taille des plantes à traiter. Ne pas appliquer dans un volume de pulvérisation dépassant 1 500 L/ha.

Lorsque les conditions environnementales et le stade de la plante favorisent le développement rapide de la maladie, utiliser Regalia® Maxx Biofongicide en concentré liquide dans un programme de rotation avec d'autres fongicides homologués.

Poivron

Culture en serre

Répression du blanc (*Leveillula taurica*)

Dose : 0,125 à 0,25 % vol/vol (1,25 à 2,50 mL/L ou 500 à 1 000 mL par 400 L d'eau)

Commencer à traiter dès l'apparition de la maladie, ou lorsque les conditions commencent à favoriser le développement de la maladie. Répéter au besoin à un intervalle de 7 à 10 jours. Pulvériser le produit jusqu'à tout juste avant le ruissellement. Le volume de pulvérisation réel variera selon la taille des plantes à traiter. Ne pas appliquer dans un volume de pulvérisation dépassant 1 500 L/ha.

Lorsque les conditions environnementales et le stade de la plante favorisent le développement rapide de la maladie, utiliser Regalia® Maxx Biofongicide en concentré liquide dans un programme de rotation avec d'autres fongicides homologués.

Raisin

Répression du blanc (*Uncinula necator*)

Appliquer Regalia® Maxx Biofongicide en concentré liquide à titre préventif ou dès l'apparition de la maladie à raison de 0,125 à 0,25 % vol/vol dans 500 à 1 500 litres d'eau par hectare après la levée des plantules, et lorsque les nouvelles pousses mesurent environ 1 à 3 cm de longueur. Répéter les applications à des intervalles de 7 à 14 jours selon le stade de croissance des cultures et la pression exercée par la maladie. Lorsque les conditions environnementales et le stade de croissance des plantes

favorisent le développement rapide de la maladie, utiliser Regalia® Maxx Biofongicide en concentré liquide dans le cadre d'un programme de rotation avec d'autres fongicides homologués.

Répression de la moisissure grise des grappes de la vigne (*Botrytis cinerea*)

Appliquer Regalia® Maxx Biofongicide en concentré liquide à titre préventif à raison de 0,25 % vol/vol dans 500 à 1 500 litres d'eau par hectare dès la floraison. Répéter les applications au moment de la formation complète de la grappe, à la véraison et avant la récolte. Lorsque les conditions environnementales et le stade de croissance des plantes favorisent le développement rapide de la maladie, utiliser Regalia® Maxx Biofongicide en concentré liquide dans le cadre d'un programme de rotation avec d'autres fongicides homologués.

Fraise

Culture à l'extérieur et culture en serre

Répression du blanc (*Sphaerotheca macularis*)

Appliquer Regalia® Maxx Biofongicide en concentré liquide à titre préventif ou dès l'apparition de la maladie à raison de 0,125 à 0,25 % vol/vol dans 500 à 1 000 litres d'eau par hectare. Répéter les applications à des intervalles de 7 à 10 jours selon le stade de croissance des cultures et la pression exercée par la maladie. Lorsque les conditions environnementales et le stade de croissance des plantes favorisent le développement rapide de la maladie, utiliser Regalia® Maxx Biofongicide en concentré liquide dans le cadre d'un programme de rotation avec d'autres fongicides homologués.

Répression de la moisissure grise (*Botrytis cinerea*)

Appliquer Regalia® Maxx Biofongicide en concentré liquide à titre préventif ou dès l'apparition de la maladie à raison de 0,25 % vol/vol dans 500 à 1 000 litres d'eau par hectare. Répéter les applications à des intervalles de 7 à 10 jours selon le stade de croissance des cultures et la pression exercée par la maladie. Lorsque les conditions environnementales et le stade de croissance des plantes favorisent le développement rapide de la maladie, utiliser Regalia® Maxx Biofongicide en concentré liquide dans le cadre d'un programme de rotation avec d'autres fongicides homologués.

Bleuets en corymbe

Répression de la pourriture sclérotique (*Monolinia vaccinii-corymbosi*)

Appliquer Regalia® Maxx Biofongicide en concentré liquide à titre préventif au stade de débourrement à raison de 0,125 à 0,25 % vol/vol dans 400 à 800 litres d'eau par hectare. Répéter les applications à des intervalles de 7 à 10 jours selon le stade de croissance des cultures et la pression exercée par la maladie. Lorsque les conditions environnementales et le stade de croissance des plantes favorisent le développement rapide de la maladie, utiliser Regalia® Maxx Biofongicide en concentré liquide dans le cadre d'un programme de rotation avec d'autres fongicides homologués.

Répression de la pourriture des fruits, dont la moisissure grise (*Botrytis cinerea*), l'anthracnose (*Colletotrichum acutatum*) et l'alternariose (*Alternaria* spp.)

Appliquer Regalia® Maxx Biofongicide en concentré liquide à titre préventif au stade de la pointe verte à raison de 0,25 % vol/vol dans 400 à 800 litres d'eau par hectare. Répéter les applications à des intervalles de 7 à 10 jours selon le stade de croissance des cultures et la pression exercée par la maladie. Lorsque les

conditions environnementales et le stade de croissance des plantes favorisent le développement rapide de la maladie, utiliser Regalia® Maxx Biofongicide en concentré liquide dans le cadre d'un programme de rotation avec d'autres fongicides homologués.

Pomme

Répression du blanc (*Podosphaera leucotricha*), de l'ensemble de maladies de la tache de suie, de la moucheture (*Zygophia jamaicensis*) et des pourritures alternariennes après la récolte (*Alternaria* spp.), de la pourriture blanche (*Botryosphaeria dothidea*) et de la pourriture amère (*Colletotrichum* spp.)

Appliquer Regalia® Maxx Biofongicide en concentré liquide à titre préventif au stade du bouton rose à raison de 0,125 % vol/vol dans 1 000 litres d'eau par hectare. Répéter les applications à des intervalles de 7 à 10 jours selon le stade de croissance des cultures et la pression exercée par la maladie. Dès la chute des pétales, appliquer Regalia® Maxx Biofongicide en concentré liquide à raison de 0,125 à 0,25 % vol/vol dans 1 000 litres d'eau par hectare à des intervalles de 10 à 14 jours selon le stade de croissance des cultures et la pression exercée par la maladie. Lorsque les conditions environnementales et le stade de croissance des plantes favorisent le développement rapide de la maladie, utiliser Regalia® Maxx Biofongicide en concentré liquide dans le cadre d'un programme de rotation avec d'autres fongicides homologués.

Gazon

Répression partielle des brûlures en plaques (*Sclerotinia homoeocarpa*) et de l'anthracnose foliaire (*Colletotrichum cereale*)

Appliquer Regalia® Maxx Biofongicide en concentré liquide à titre préventif ou dès l'apparition de la maladie à raison de 0,25 % vol/vol dans 1 000 à 1 500 litres d'eau par hectare. Répéter les applications à des intervalles de 7 à 10 jours selon le stade de croissance des cultures et la pression exercée par la maladie. Lorsque les conditions environnementales et le stade de croissance des plantes favorisent le développement rapide de la maladie, utiliser Regalia® Maxx Biofongicide en concentré liquide dans le cadre d'un programme de rotation avec d'autres fongicides homologués.

Mises en garde propres au produit

Lire et bien comprendre toute l'étiquette avant d'ouvrir le contenant. Pour toute question, appeler les fabricants au 1-877-664-4476 ou obtenir des conseils techniques auprès du distributeur ou du représentant provincial en agriculture ou en foresterie.

Brevets américains n° 4,863,734 et n° 5,989,429
Regalia® est une marque de commerce de Marrone Bio Innovations, Inc.
Le nom et le logo Marrone Bio Innovations sont des marques déposées de Marrone Bio Innovations, Inc.
© Marrone Bio Innovations, Inc.
1540 Drew Ave., Davis (CA) 95618
1-877-664-4476
www.marronebio.com
info@marronebio.com